

GLUCOSA LAVOISIER 30%, Solución inyectable IV en ampolla

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

GLUCOSA MONOHDRATO 33 g
(cantidad correspondiente en glucosa anhidra 30 g)
Agua para inyectables c.s.p..... 100 ml
para 100 ml de solución inyectable

Osmolaridad: 166,5 mOsm/100 ml
Aporte calórico glucídico: 1200 Kcal/l
El pH oscila entre 3,5 y 6,5

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable IV

DATOS CLÍNICOS

Indicaciones terapéuticas

Tratamiento de urgencia de la hipoglucemia grave.

Posología y forma de administración

Estrictamente por vía intravenosa periférica lenta.

La posología depende del estado clínico del enfermo, del peso, de la alimentación y de los posibles tratamientos complementarios.

Advertencias y precauciones especiales de empleo

Advertencias

SOLUCIÓN HIPERTÓNICA: la inyección intravenosa debe efectuarse muy lentamente.

Precauciones de empleo

- Controlar el estado clínico y biológico, en concreto la glucosuria y la acetonuria, la potasemia y la glucemia.
- En caso necesario, complementar el aporte parenteral con potasio e insulina.

Reacciones adversas

- Hiperglucemia
- Riesgo de necrosis tisular en caso de extravasación.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Propiedades farmacodinámicas

PRODUCTO DE APOORTE GLUCÍDICO (B: sangre y órganos hematopoyéticos)
Solución hipertónica de glucosa.
10 ml de solución aportan 12 Kcal.

Propiedades farmacocinéticas

El metabolismo es el propio de la glucosa.

DATOS FARMACÉUTICOS

Incompatibilidades

Comprobar un posible cambio de color o formación de precipitado, complejo insoluble o cristales.

Período de validez: 5 años

Naturaleza y contenido del recipiente

Ampolla de 10 ml o 20 ml (vidrio de tipo I)

PRESENTACIÓN Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Presentaciones farmacéuticas:

Ampolla

AC 362 996-8: 10 ml - caja de 10 - Reemb. por la Seg. Soc. 65% - PVP + IVA: 3,15 €

AC 362 997-4: 20 ml - caja de 10 - Reemb. por la Seg. Soc. 65% - PVP + IVA: 4,21 €

Presentaciones hospitalarias:

Ampolla

AC 564 778-1: 10 ml - caja de 100 - Uso especializado

AC 564 779-8: 20 ml - caja de 50 - Uso especializado

CONDICIONES DE DISPENSACIÓN: No procede

FECHA DE REVISIÓN: Febrero de 2004

CDM LAVOISIER

Laboratoires CHAIX et DU MARAIS - 7, rue Labie - 75017 PARÍS - FRANCIA

Tel: +33 1 55 37 83 83 Correo electrónico: contact@lavoisier.com Fax: +33 1 55 37 83 84